



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

ESAMI DI STATO

per l'abilitazione alla professione di **FARMACISTA**

Pavia 15.06.2017

**Nome**-----**Cognome** -----

**Medicamento** : -----

1) **Impieghi in farmacoterapia**

2) **Aspetti chimico-farmaceutici e meccanismo d'azione**



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA**

**ESAMI DI STATO**

per l'abilitazione alla professione di **FARMACISTA**

**Pavia 15.06.2017**

**Nome-----Cognome -----**

**3) Aspetti tecnologici della forma farmaceutica**

**4) Norme legislative di dispensazione**

**Firma**

# ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL FARMACISTA PAVIA 15.06.2017



**gsk** GlaxoSmithKline

**AUGMENTIN®**  
bambini  
400 mg/57 mg/5 ml  
polvere per sospensione orale

Amoxicillina / acido clavulanico

Flacone 140 ml  
sospensione estemporanea  
con cucchiaino dosatore

USO ORALE

**140 ml**

**gsk** GlaxoSmithKline

**AUGMENTIN®**  
bambini  
400 mg/57 mg/5 ml  
polvere per sospensione orale  
Amoxicillina / acido clavulanico  
Flacone 140 ml  
sospensione estemporanea  
con cucchiaino dosatore

USO ORALE

**Conservare a temperatura non superiore a 25°C.**

Agitare energicamente il flacone prima dell'uso.  
Prima dell'uso controllare che il sigillo del tappo sia intatto.  
Aggiungere 127 ml di acqua (oppure erettruire 2 aggiunte d'acqua fino a raggiungere il segno di livello) sul flacone (140 ml).  
Capovolgere ed agitare bene.  
Prima della somministrazione, preparare la sospensione aggiungendo acqua al contenuto del flacone, come descritto nel foglio illustrativo.  
La sospensione così ottenuta deve essere conservata in frigorifero (2-8°C) ed utilizzata entro 7 giorni dalla preparazione. Agitare bene prima dell'uso.

**AUGMENTIN®**  
bambini  
400 mg/57 mg/5 ml  
polvere per sospensione orale  
Amoxicillina / acido clavulanico

Flacone 140 ml  
sospensione estemporanea  
con cucchiaino dosatore  
USO ORALE



005774472

A.I.C.: 026089134

GlaxoSmithKline S.p.A.  
Via A. Fleming, 2 - Verona  
AUGMENTIN è un marchio registrato di proprietà del Gruppo GlaxoSmithKline

**gsk** GlaxoSmithKline

**AUGMENTIN®**  
bambini  
400 mg/57 mg/5 ml  
polvere per sospensione orale  
Amoxicillina / acido clavulanico  
Flacone 140 ml  
sospensione estemporanea  
con cucchiaino dosatore  
USO ORALE

**Medicinale soggetto a prescrizione medica.**  
Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.  
**Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**

5 ml di sospensione ricostituita contengono:  
amoxicillina tridrata corrispondente ad amoxicillina mg 400; potassio clavulanato corrispondente ad acido clavulanico mg 57.  
Crosprovidone, carnellina sodica, gomma xantano, silice colloidale anidra, magnesio stearato, aspartame, sodio benzoato, aroma fragola, silice colloidale idrata.

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL  
FARMACISTA Pavia 15.06.2017

# Dicloream<sup>®</sup>

## antinfiammatorio locale

180 mg Cerotti medicati  
DICLOFENAC IDROSSIETILPIRROLIDINA

10 cerotti medicati  
Usa cutaneo

COMPOSIZIONE: Un cerotto medicato da 180 mg contiene:

Principio attivo: Diclofenac idrossietilpirrolidina mg 180 (pari a mg 140 di Diclofenac sodico).

Eccipienti: Gellatina, Povidone, D-Sorbitolo soluzione al 70%, Caolino, Titanio diossido, Glicole propilenico, Metile paradiossibenzonato, Propile paradiossibenzonato, Edalato disodico, Acido tartarico, Dידrossilumilino antinocetato, Caramellina sodica, Poliacrilato sodico, 1,3-Butileno glicole, Polisorbato 80, Prolumo, Acqua purificata, Filtro sintetico, Film plastico.

Forma farmaceutica e contenuto: Cerotto medicato, astuccio da 10 cerotti medicati.

Tenere il medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Attenzione: leggere il foglio illustrativo prima dell'uso  
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in  
contenimento integro, correttamente conservato.

Dopo la prima apertura, il prodotto ha una validità di 3 mesi  
se la busta contenente i cerotti medicati viene correttamente richiusa.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data  
di scadenza indicata sulla confezione.

Conservare a temperatura non superiore ai 30 °C.

Il medicinale non utilizzato o i rifiuti derivati dallo stesso non devono essere gettati  
nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici.

Eliminare il prodotto non utilizzato mediante gli appositi sistemi di raccolta presenti  
nelle farmacie.

Medicinale di automedicazione

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento locale di stati dolorosi e infiammatori di natura reumatica o traumatica di articolazioni, muscoli, tendini e  
legamenti.

Principali istruzioni per l'uso:

Solo per uso cutaneo. Il prodotto deve essere applicato solo sulla cute inalterata e sana e non deve essere applicato quando  
si ha il bagno o la doccia.

Il cerotto medicato di diclofenac deve essere utilizzato per il più breve tempo possibile in relazione all'indicazione d'uso.



1 • Tagliare la busta contenente i cerotti,  
lungo il segno tratteggiato



3 • Staccare il foglio di plastica che  
protegge la superficie adesiva del  
cerotto



2 • Prelevare un cerotto e richiudere la  
busta, premendo il cordoncino di  
chiusura



4 • Applicare il cerotto sulla parte  
dolente, facendo aderire alla pelle



17 13546 00

# Dicloream<sup>®</sup>

## antinfiammatorio locale


180 mg

Cerotti medicati

DICLOFENAC IDROSSIETILPIRROLIDINA

10

Cerotti medicati  
Usa cutaneo



ALFA WASSERMANN

2

ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL  
FARMACISTA Pavia 15.06.2017

**Lasix**  **fiale 20 mg/2 ml**  
**soluzione iniettabile**  
**furosemide**



Uso endovenoso/intramuscolare

**5 fiale**

**SANOFI** 

Una fiala contiene 20 mg di furosemide.  
Contiene sodio idrossido, sodio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili. Per ulteriori informazioni leggere il foglio illustrativo. Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.  
Può alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Leggere il foglio illustrativo prima dell'uso.  
Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.  
Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.